



I vaccini proteggono la vita

Scegli di proteggere chi ami

I vaccini sono sicuri per la futura mamma e per il nascituro

Le vaccinazioni sono gratuite per la futura mamma e i suoi familiari

Il medico di famiglia e l'ostetrica ti possono informare sui vaccini, consultali

Vaccinarsi in gravidanza è un atto d'amore



PERCHÉ È IMPORTANTE VACCINARSI?

In gravidanza le difese immunitarie della donna si riducono, rendendola maggiormente soggetta a infezioni batteriche e virali.

Inoltre il bambino appena nato non ha alcuna difesa rispetto a malattie infettive che, se contratte prima che sia stato vaccinato, possono essere molto rischiose.

La pertosse nel neonato nei primi mesi di vita può essere molto grave o persino mortale e la fonte di infezione è frequentemente la madre.

Si può manifestare con difficoltà respiratorie talvolta gravi che possono provocare un arresto respiratorio: ancora oggi, nel mondo, 1 neonato su 1000 muore di pertosse.

L'influenza nella mamma può provocare complicazioni respiratorie gravi che possono condurre al ricovero in ospedale; in alcuni casi la febbre può contribuire allo sviluppo di anomalie fetali e ritardi di crescita del bambino durante la vita intrauterina nonché ad aumentare il rischio di parto prematuro.

Le vaccinazioni riducono il rischio di contrarre tali infezioni e proteggono sia la mamma che il bambino nei primi mesi di vita quando non è ancora possibile vaccinarlo.

QUALI VACCINI?

Vaccino anti-influenzale Nel secondo o terzo trimestre di gravidanza una dose per difendersi dall'influenza stagionale. Conferisce protezione solo per una stagione, va quindi ripetuto ogni anno.

Vaccinazione contro Differite Tetano e Pertosse (dTAp): Tra la 27° e la 36° settimana in un'unica somministrazione per tre vaccini. Ogni donna incinta dovrebbe vaccinarsi a ogni gravidanza (anche se ne avesse una per anno).

CHIEDI AL TUO MEDICO DI FAMIGLIA E ALL'OSTETRICA

VACCINO ANTI-INFLUENZALE

L'influenza è una delle malattie più comuni e tra le più rischiose.

Il vaccino è raccomandato a tutte le donne in gravidanza, in particolare quelle che saranno nel secondo o terzo trimestre di gravidanza all'inizio dell'epidemia. È offerto gratuitamente alla mamma e ai familiari per garantire la protezione dalla malattia e limitare il rischio della trasmissione del virus.

La vaccinazione deve essere ripetuta ad ogni gravidanza in cui il secondo e terzo trimestre o la nascita del neonato coincidano con la stagione influenzale.

VACCINO DIFTERITE TETANO PERTOSSE (dTPA)

La pertosse nel neonato può provocare gravi complicanze respiratorie talvolta mortali.

Il richiamo del vaccino può essere somministrato alla madre durante tutto il periodo della gravidanza, ma il momento migliore è tra la 27° e la 36° settimana di gestazione, l'ideale sarebbe alla 28° settimana.

Poiché l'immunità dalla pertosse non è permanente, ogni donna incinta dovrebbe ripetere il richiamo, che non ha alcun effetto collaterale, ma garantisce la produzione degli anticorpi necessari a tutelare la salute del neonato. Il vaccino è raccomandato e offerto gratuitamente anche ai familiari che avranno contatto con il bambino dopo la nascita, per garantire l'effetto "cocoon" ossia la "strategia del bozzolo" che crea una zona di sicurezza attorno al piccolo appena nato.

ALTRE VACCINAZIONI

In caso di particolari condizioni di rischio infettivo possono essere indicate anche le vaccinazioni contro meningococco, pneumococco, epatite A ed epatite B.

QUANDO FARE I VACCINI?

Vaccino anti-influenzale

Tra la 14° e la 36° settimana

Difterite Tetano e Pertosse (dTAp)

Tra la 27° e la 36° settimana, ideale alla 28°