

Indagine campionaria

# «CAREGIVER AL FEMMINILE»

GENNAIO 2018



Indagine condotta sui MMG, attraverso un questionario orientato a comprendere il mondo delle assistenze domiciliari, focalizzando l'attenzione sul caregiver, molto spesso donna, sulle sue fatiche e sul lavoro prezioso ed insostituibile che svolge.


Indagine campionaria

«CAREGIVER AL  
FEMMINILE»


GENNAIO 2018

MMG partecipanti

n. 511




# DISTRIBUZIONE DEL CAMPIONE PER GENERE



■ Maschio ■ Femmina


# DISTRIBUZIONE DEL CAMPIONE PER GENERE nelle indagini del CS FIMMG

## survey «CAREGIVER AL FEMMINILE»




### INDAGINI CENTRO STUDI FIMMG


## 2016




NAO / TAO



SANITÀ  
INTEGRATIVA




ICT in MG




DECR. «APPRO-  
PRIATEZZA»

### INDAGINI CENTRO STUDI FIMMG


## 2017




ICT in MG



LEGGE SU  
«DOLORE»




BIOSIMILARI




PAY FOR PER-  
FORMANCE

# IN QUALE PERCENTUALE DEI CASI L'ASSISTENZA DOMICILIARE E' GESTITA PREVALENTEMENTE DA UNA FIGURA FEMMINILE?



Per il 69% delle risposte c'è una figura femminile dal 80 al 100% dei casi.




La presenza femminile sembrerebbe essere più spesso riferita dai MMG del Nord



# IN QUALE PERCENTUALE DEI CASI L'ASSISTENZA DOMICILIARE E' GESTITA PREVALENTEMENTE DA UNA FIGURA FEMMINILE?





- 91-100%
- 81-90%
- 71-80%
- <70%



# QUALI SONO LE FIGURE FEMMINILI COINVOLTE?




La «badante» è la figura più frequentemente coinvolta; soprattutto al Centro, meno al Sud dove la famiglia sembra svolgere un ruolo prevalente






# QUALI SONO LE FIGURE FEMMINILI COINVOLTE?

I MMG di genere maschile riferiscono una presenza di «badanti» superiore rispetto alle colleghe.




# NELLA TUA ESPERIENZA, IL CAREGIVER PUÒ APPOGGIARSI SULLA PRESENZA DI UNA RETE FAMILIARE DI SOSTEGNO?

Una rete familiare di vero sostegno al caregiver viene riferita dal 50% dei MMG.




- Quasi sempre / Spesso
- A volte
- Raramente / Quasi mai


Il 15% dei MMG riferisce che al Sud, la rete familiare di sostegno è assente.




NELLA TUA ESPERIENZA, IL CAREGIVER  
PUÒ APPOGGIARSI SULLA PRESENZA  
DI UNA RETE FAMILIARE DI  
SOSTEGNO?



Sono i MMG di genere femminile che sembrano percepire una rete familiare meno presente.




- Quasi sempre / Spesso
- A volte
- Raramente / Quasi mai






# IL CAREGIVER È AFFETTO DA PATOLOGIA CRONICA?

Accade frequentemente che lo stesso caregiver sia affetto da patologia cronica. La metà del campione indica che il problema c'è «quasi sempre»/«spesso».




- Quasi sempre / Spesso
- A volte
- Raramente / Quasi mai




Questo problema è rilevato maggiormente al Sud, di meno al Nord.


# IL CAREGIVER È AFFETTO DA PATOLOGIA CRONICA?



Sono, anche qui, di più i MMG donne che sembrano percepire una maggiore frequenza del problema.




- Quasi sempre / Spesso
- A volte
- Raramente / Quasi mai




# IL CAREGIVER MOSTRA SINTOMI RICONDUCEBILI A SINDROME DEPRESSIVA?

La maggioranza dei MMG riferisce che «quasi sempre»/«spesso» il caregiver è affetto da sindrome depressiva




- Quasi sempre / Spesso
- A volte
- Raramente / Quasi mai

Questo problema è riferito più consistentemente dai MMG del Sud





# IL CAREGIVER MOSTRA SINTOMI RICONDUCEBILI A SINDROME DEPRESSIVA?




Anche in questo caso, la sintomatologia depressiva sembra essere maggiormente percepita dai MMG donne rispetto ai loro colleghi.

- Quasi sempre / Spesso
- A volte
- Raramente / Quasi mai




# QUALE FIGURA SI RECA PIÙ FREQUENTEMENTE DAL MEDICO PER RIFERIRE PROBLEMI DI SALUTE DI ALTRI COMPONENTI DELLA FAMIGLIA?

La quasi totalità del campione identifica in una figura femminile la persona che si reca dal MMG a riferire i problemi sanitari della famiglia




- Maschile
- Femminile
- Non ci sono grandi differenze





# QUALE FIGURA SI RECA PIÙ FREQUENTEMENTE DAL MEDICO PER RIFERIRE PROBLEMI DI SALUTE DI ALTRI COMPONENTI DELLA FAMIGLIA?





Non sembrano esservi differenze evidenti tra quanto riportato da MMG uomini e donne

■ Maschile


■ Femminile

■ Non ci sono grandi differenze




# QUANTE SONO, TRA I TUOI ASSISTITI, LE DONNE LAVORATRICI IMPEGNATE NELLA GESTIONE DI FAMILIARI CON BISOGNI ASSISTENZIALI DI TIPO CRONICO?


Per il 40% delle risposte la quota delle donne lavoratrici con impegni assistenziali importanti, supera il 4%.




- <2%
- 2-4%
- 4-6%
- 6-8%
- 8-10%
- >10%




# QUANTE SONO, TRA I TUOI ASSISTITI, LE DONNE LAVORATRICI IMPEGNATE NELLA GESTIONE DI FAMILIARI CON BISOGNI ASSISTENZIALI DI TIPO CRONICO?



Il 48% delle risposte date dai MMG donne indica che la quota delle lavoratrici con impegni assistenziali supera il 4%, contro il 32% di analoghe risposte fornite dai loro colleghi uomini.



- <2%
- 2-4%
- 4-6%
- 6-8%
- 8-10%
- >10%



# CONCLUSIONI

- Il primo dato evidente riguarda l'elevata prevalenza della partecipazione di donne MMG ad una survey orientata ad esplorare il mondo dell'assistenza gestita da figure femminili; questo tema ha richiamato a partecipare una quota molto elevata ed inconsueta di medici donne.
- Emerge dall'indagine che il ruolo di caregiver è ricoperto quasi sempre dalla donna; più spesso la «badante», ma in alcune realtà (forse anche per non poter affrontare i costi di una assistenza esterna, questo probabilmente più al Sud) sono coinvolte altre figure femminili della famiglia.
- Sempre più in difficoltà appare, complessivamente, la rete familiare che non sempre riesce a supportare il caregiver.

# CONCLUSIONI - 2

- L'indagine conferma alcuni dati consolidati della letteratura: il caregiver, quasi sempre donna, è spesso affetta da patologia cronica e, in particolare, da sindrome depressiva. Entrambi gli aspetti sembrano essere prevalenti nelle regioni del Sud, dove il ruolo di caregiver è meno frequentemente delegato alle badanti e dove, pertanto, il carico assistenziale espone maggiormente i familiari, spesso anziani.
- Le figure femminili sono quelle che si fanno quasi sempre carico di gestire i problemi sanitari degli altri componenti della famiglia, a fronte del fatto che, spesso, a questi oneri devono sommare i propri impegni lavorativi.

# CONCLUSIONI - 3

- Un dato importante che emerge dall'indagine riguarda le differenze evidenti tra quanto viene riferito, su più items della survey, dai medici donne rispetto ai loro colleghi uomini.
- Su un tema dedicato all'impegno assistenziale «di genere», i dati raccolti dai MMG donne evidenziano livelli più elevati di criticità: è più preoccupante il dato rispetto al cedimento della rete familiare, sono più elevate le risposte che tendono ad individuare una più alta prevalenza di patologia cronica e sindrome depressiva del caregiver. Maggiore sembra anche essere il tasso riferito di donne lavoratrici, con elevati carichi assistenziali a domicilio.

# CONCLUSIONI - 4

- Dalla survey sembrerebbe emergere, cioè, una sensibilità maggiore, evidentemente più affinata, delle donne nel riuscire a percepire le criticità di questi fenomeni.
- È probabile che possa essere intervenuta, nel rafforzare e sostenere tale sensibilità, una sorta di «solidarietà di genere», resa evidente anche dalla elevata ed insolita partecipazione di donne medico all'indagine.