

Elaborazione dati del Questionario sulla Terapia Anticoagulante Orale



Il campione

- Hanno risposto al questionario 477 MMG
 - 77,6% maschi
 - 23,3% femmine

Distribuzione % per età




Attività medicina generale


Quale è la tua principale attività in Medicina Generale?		
	Frequenza	%
Assistenza Primaria	454	95,2
Continuità Assistenziale	23	4,8
Totale	477	100

Puoi indicare la modalità principale secondo cui eserciti come medico di assistenza primaria?		
	Frequenza	%
Altra modalità aggregativa	22	4,8
Associazione semplice	33	7,3
Gruppo	205	45,2
Rete	137	30,2
Studio singolo	57	12,6
Totale	454	100,0


MMG rispondenti per Regione in cui è presente lo studio per milione di abitanti




Distribuzione % per collocazione studio principale




Distribuzione % per numero pazienti in carico



Distribuzione % per numero pazienti in carico trattati con TAO




Distribuzione % per numero pazienti in carico trattati con NAO



Presenza di servizi di gestione integrata tra Centro TAO e MMG per pazienti in terapia anticoagulante

	Frequenza	%
No	336	70,4
Sì	141	29,6
Totale	477	100


Tipologia di servizi di gestione integrata tra TAO e MMG



Presenza di servizi di gestione integrata per paziente con patologia cronica

	Frequenza	%
No	226	47,4
Sì	251	52,6
Totale	477	100

Distribuzione % per area assistenziale dei servizi offerti




Presenza strategie, condivise con i MMG, orientate all'appropriatezza prescrittiva per la terapia anticoagulante

	Frequenza	%
No	336	70,4
Sì	141	29,6
Totale	477	100


Frequenza media mensile monitoraggi pazienti TAO

	Frequenza	%
0	2	0,4
1	99	20,8
2	287	60,2
3	56	11,7
4	23	4,8
5	2	0,4
6	3	0,6
8	1	0,2
10	1	0,2
15	1	0,2
20	2	0,4
Totale	477	100

Distribuzione % del numero di pazienti seguiti dal MMG nel monitoraggio della TAO




Distribuzione % del peso attribuito ad alcuni fattori per i pazienti in TAO




1=criticità minima; 5=criticità massima

Distribuzione % del peso attribuito a fattori che condizionano diffusione NAO



Distribuzione % per peso attribuito ad alcuni fattori per i pazienti in NAO



1=criticità minima; 5=criticità massima

Prescrizione in autonomia NAO

	Frequenza	%
No	88	18,4
Sì	389	81,6
Totale	477	100

No perchè:

	Frequenza	%
Elevato costo	15	17,0
Informazione inadeguata	36	40,9
Preoccupazione sui rischi	25	28,4
Altro	12	13,6
Totale	88	100,0

Formazione


Hai mai partecipato ad un evento di formazione sulla NAO ?

	Frequenza	%
No	93	19,5
Sì	384	80,5
Totale	477	100,0


Se no, pensi che un evento formativo su questo argomento potrebbe esserti utile?

	Frequenza	%
No	2	2,2
Sì	91	19,1
Totale	93	100

Distribuzione % per numero paz. trattati con antiaggreganti piastrinici



Criticità per pazienti trattati con ASA



Sintesi (1/4)

- Da quanto sopra è possibile stimare, ipotizzando un numero di assistiti pari a 1500 per MMG, che in media:
 - 1,4% degli assistiti è trattato con TAO
 - 0,5% degli assistiti è trattato con NAO
 - 9,1% degli assistiti è trattato con ASA
 - C'è quindi un rapporto 1 a 3 tra NAO e TAO come riscontrabile anche dai dati IMS
 - Il numero di trattati appare sovra stimato
-

Sintesi (2/4)

- Solo il 30% dei MMG possono usufruire di un servizio di gestione integrata con i centri TAO e questa riguarda principalmente una rapida consulenza
 - Nel 60% dei casi per i pazienti TAO vengono effettuati due monitoraggi mensili
 - Oltre il 50% dei MMG effettuano direttamente il monitoraggio dei propri pazienti trattati con TAO
-

Sintesi (3/4)

- Le maggiori criticità individuate dai MMG sono:
 - per i pazienti trattati con TAO: aderenza agli stili di vita e sicurezza del trattamento
 - per i pazienti trattati con NAO: elevato costo del trattamento, basso numero di specialisti autorizzati alla prescrizione e scarsa disponibilità degli stessi alla prescrizione
 - per i pazienti trattati con ASA: sicurezza del trattamento
-

Sintesi (4/4)

- Oltre l'80% dei MMG rispondenti prescriverebbe un NAO in autonomia
 - Sempre l'80% circa dei rispondenti ha partecipato ad eventi formativi sull'argomento e chi non ha partecipato riterrebbe la formazione sull'argomento utile ed opportuna
-