


Survey

USO RESPONSABILE DELL'ALCOL




Campione: 153 medici


A cosa corrisponde l'Unità Alcolica (UA)?




Cosa si intende per “consumo a rischio” giornaliero di alcol?




Quale ritieni sia la bevanda di cui i tuoi pazienti abusano di più?




Considerando i tuoi pazienti minorenni, a quale età hanno dichiarato di avere consumato la prima bevanda alcolica?




Fermo restando il divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche ai minori di 18 anni, quale credi sia la bevanda alcolica più consumata dai tuoi pazienti minorenni?




Quale ritieni sia l'apporto calorico per un bicchiere di birra (da 330 ml a 4,5°); di vino rosso (da 125 ml a 12°) e di superalcolico (da 40 ml a 37°)?




Cosa si intende per “dipendenza da alcol”?




Perché nelle donne è consigliato il consumo di metà unità alcoliche rispetto all'uomo?




Perché l'anziano è più suscettibile agli effetti negativi delle bevande alcoliche?




Considerando il profilo medio dei tuoi pazienti – in assenza di patologie specifiche, ritieni che i consumi giornalieri di bevande alcoliche compresi entro 2 UA per gli uomini, 1 UA per le donne e per gli anziani sopra i 65 anni, possano essere considerati:




Cosa si intende per problemi e patologie alcol-correlati (PPAC)?




Cosa si intende per “binge drinking”?




I “binge drinkers” presentano un aumentato rischio di incidenza di fibrillazione atriale e di ictus cerebrale. Alla luce delle dichiarazioni dei tuoi pazienti, quale ritieni che sia la percentuale di “binge drinkers”?




Perché, nei consumatori che superano le unità alcoliche consentite, l'alcool è classificato tra i cancerogeni di classe 1 dall'International Agency for Research on Cancer (IARC)?




Quali strategie secondo l'OMS prevedono un ruolo del MMG nel combattere le problematiche alcol-correlate?




Registri il dato “consumo di alcool” nella cartella clinica dei tuoi pazienti?




Credi che, nel setting della medicina generale, sia utile l'utilizzazione di un test rapido (es. AUDIT-C) per l'identificazione dell'abuso alcolico?




Ritieni che un intervento breve di counseling possa essere efficace nel ridurre i comportamenti a rischio legati al consumo di alcool?




Nel territorio dove lavori sei a conoscenza dell'esistenza di servizi socio-sanitari di supporto pubblici o privati cui far riferimento?




Ritieni che, nell'ambito di una campagna informativa di prevenzione che coinvolge il MMG, possa essere efficace per i pazienti sapere quanti minuti di attività fisica sono necessari per consumare le calorie ingerite con una unità alcolica?



Ritieni che, nell'ambito di una campagna informativa di prevenzione, si possa coinvolgere il MMG, per chiarire in quali condizioni fisiologiche e patologiche è sconsigliato l'uso di alcol?



Ritieni che, nell'ambito di una campagna informativa di prevenzione, il Medico di Medicina Generale possa dare informazioni ed indicazioni strutturate sull'uso moderato dell'alcol?



Ritieni utile per i MMG una formazione specifica sul tema dell'assunzione di alcol?

